

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百

十九
二十

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣李克丈

欽定四庫全書

普濟方卷三百十九

明

周王朱橚 撰

婦人諸疾門

客熱 附論

夫婦人有氣血陰陽臟腑虛則生熱虛則受邪邪熱加人陰陽冷熱自相承也今云客熱者是體虛而將溫過度外熱加之非腑臟自生故云客熱其狀上焦胸膈之間虛熱口燥心煩手足壯熱者是也

方

羚羊角散 治婦人客熱心神煩躁體熱四肢疼痛不

思飲食

羚羊角屑

三分

紅花子

半兩

赤芍藥

半兩

當歸

半兩

剉碎微炒

枳殼

半兩

麩炒微黃去穢

赤茯苓

一兩

犀角屑

半兩

生乾地黃

一兩

剉

人參

三分

去蘆頭

麥門冬

三分

去心

檳榔

各半兩

甘草

炙微赤剉

剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時

生乾地黄丸 治婦人客熱面赤頭疼口舌生瘡心胸

煩壅飲食無味

生乾地黄

一兩

羚羊角屑

白鮮皮

葳蕤

各半兩

黃連

三分去頭鬚

黃耆

半兩炙微赤炒

羚羊角

麥門冬

三兩去心焙

玄參

地骨皮

各半兩

川大黃

一兩

甘草

半兩炙微赤炒

右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下三十丸

黃耆丸

治婦人客熱心神壅悶肢節煩疼少思飲食

麥門冬

一兩半
去心

生乾地黄

一兩

犀角屑

人參

三分
去蘆頭

茯苓

三分

薤白子仁

半兩

黃芩

半兩

甘草

半兩

右為細散每服不計時候以竹葉湯二錢一方無麥

門冬

丹砂散

治婦人客熱心神煩躁口乾舌澀飲食無味

丹砂

一兩
細研
水飛過

犀角屑

天竹黃

胡黃連

各半兩

麥門冬

三兩
去心
焙

寒水石

細研

馬牙硝

一分
細研

鉛霜

半兩
細研

右為細散入研了藥令勻每服不計時候以竹葉湯

調下一錢

治婦人客熱煩渴頭疼痰湧如泉

一名玉雙散

石膏

二兩細研水飛過

寒水石

一兩細研

右為散同研勻每服不計時候以生地黄湯調下一

錢

犀角散 治婦人客熱四肢悶煩疼痛不下飲食

犀角 赤芍藥 地骨皮 紅花 冬草 半兩 人參

北柴胡 黃耆 一兩 麥門冬 赤茯苓

各三分

右咬咀每服二錢水二盞薑三片煎至七分去滓無時溫服一方有生地黃七分半

麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶頭疼不下飲食

麥門冬 北柴胡 赤茯苓 羚羊角屑

赤芍藥 桑白皮 黃耆 生乾地黄

甘草

各半兩

右咬咀每服四錢水二盞薑三片煎六分去滓溫服無時候

治客熱 以白油麻作飲汁服之

寒熱 附論

夫陽虛在外則寒陰虛在內則熱陽盛則熱陰盛則寒故婦人勞傷氣血虛寒熱相搏令陰陽二氣虛實不調故令寒熱也

方

桃仁丸 治婦人頭目昏重心神煩悶或時寒熱肢節疼痛不欲飲食

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

芩薊

白朮

各半兩

柴胡

一兩去黃

赤茯苓

三分

枳殼

半兩麩炒微黃去穢

赤芍藥

半兩

訶梨勒皮

三分

人參

一兩去蘆頭

酸棗

一兩微炒

生乾地黄

一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以生薑荆芥薄荷湯下三十丸

地骨皮散

治婦人血風氣體虛發歇寒熱如瘧經曰三

陽不足則先寒後熱三陰不足則先熱後寒陰陽交爭

虛實不調

方見木陽血風勞氣類

鼈甲

一兩

令黃去裙

生乾地黄

一兩

當歸

人參

各三分去蘆頭

甘草

半兩炙
微赤判

木香

半兩

白朮

一兩

桂心

二分

桃仁

一兩湯浸
去皮尖

右為末煉蜜和三百丸如梧桐子大每於食前以溫

酒下三十九

鼈甲散

出聖
惠方

治婦人寒熱肌瘦煩疼

鼈甲

二兩塗醋炙
令黃去裙襴

白茯苓

枳殼

麩炒微
黃去穢

白芍藥

當歸

五加皮

羌活

桃仁

湯浸去皮
尖炒微黃

菴藺子

白朮

柴胡

各一兩
去苗

甘草

半兩炙
微赤判

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

黃耆散

出聖惠方

治婦人血脈不調發歇寒熱胸膈煩躁不

思飲食四肢疼痛

黃耆

一兩去蘆頭

赤芍藥

半兩

麥門冬

三分去心

赤茯苓

白朮

各三分

羚羊角屑

半兩湯洗

半夏

半兩

前胡

去蘆頭三分

當歸

一兩 枳殼

一兩麩炒微黃去穢

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

七寶湯

治寒熱往來

防風

去蘆

知母

去蘆

生地黄

各半兩

柴胡

去蘆

秦艽

甘草

各二錢半炙

前胡

去蘆二錢半

右咬咀每服五錢水一盞半加人參三寸煎至七分

熱服

油煎散

出永類飲

治血虛寒熱四肢酸倦無力瘦瘁不進飲

食

川烏

海桐皮

地骨皮

五加皮

牡丹皮

陳橘皮 桂心 白芍藥 川芎 當歸 烏藥

白芷 莪茂

各等分

右為末每服二錢入生麻油三四點煎至七分溫服

無時候日三服

柴胡散

出聖惠方

治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不

欲飲食

北柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮

各一兩

地骨皮

人參 枳殼

製

生乾地黄

黃苦梗

桑白皮

赤芍藥

各三分

鼈甲

炙二兩

麥門冬

三兩

甘草

半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓

溫服無時候一方無鼈甲

青蒿散

出永類鈴方

治男子婦人肢體倦疼虛勞寒熱

用青蒿八九月間成實時採去枝梗以蒿用童子小便浸三日晒乾為末每服二錢烏梅一箇煎至七分服

生乾地黄散

出聖惠方

治婦人風血氣或時寒熱體疼不思

飲食

方見本門
虛損類

諸勞

鼈甲煎

出大全
良方

治勞

鼈確

一箇重
一斤者

杏仁

去皮尖雙
仁麩炒

柴胡

貝母

去
心

知母

各四
兩

右除鼈外諸藥細剉以好酒五升入鍋內將活鼈在
中以藥和勻圍定上用版子石壓之令活鼈在藥內
喫酒藥候來日却以慢火煮候酒盡為度却取鼈令

患人喫盡次將鰾甲用醋炙黃入在前項諸藥內焙
乾為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大用米飲吞下
三十丸無時候日五服治一切婦人室女思慮所感
變化勞候其病變狀多端骨節軟弱背膊勞倦或乍
寒乍熱夜夢不祥或項頸酸疼四肢無力小便下水
濃似米泔忽頭骨冷痛精神倦怠忽血氣刺痛攻心
飲食減少口無滋味此皆肝腎感傷之所致也但臟
腑傷冷體氣虛弱宜喫此方若經候行少忽不通不

宜服

出楊子建
獲命方

當歸

一兩

草薺

益智

去皮

鼈甲

醋炙

川芎

杜仲

去皮

茱萸

石薺

獨活

茯苓

藁本

各半兩

木香

荊三稜

各一分

右為細末每服三錢水一盞煎兩三沸空心去滓服

和蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下三十丸亦佳

治一切婦人室女虛勞證候既喫前方藥了仍喫此清

心煎藥對當前方藥服餌若更有發嗽急修合下

面保肺藥喫也

出楊子建
獲命方

桑寄生

兩半

木香

鼈甲

醋炙

天靈蓋

蘇炙
黑色

前胡

去毛

柴胡

去毛

沉香

麥冬

去心

茯苓

各一分

黃連

三銖

右為細末砂盆內水磨犀角取汁一盞煎藥二錢取

服食後

治一切婦人室女有前方所說虛勞之候下部脉微上

部脉盛即將此藥對前面補藥喫也上部脉不盛大

却微有嗽亦請依法加減此方服餌

出楊子建
獲命方

桔梗

紫蘇

杏仁

去尖

紫苑

黃芩

鼈甲

炙醋

蛤蚧

蘇炙深黃色

天靈蓋

蘇炙焦黑色

柴胡

去毛各一分

麻黃

去根半兩

右為末每服二錢水一盞生薑一小片同煎三沸食

後徐徐去滓服若上部脉不盛却減黃芩一味不喫

也

明月丹

出大全良方

治諸勞

兔屎

四十粒

硃砂

如兔屎大四十九粒

右為研生蜜丸如梧桐子大以甘草半兩碎之水浸一宿取汁五更初下七丸勿令病人知勞病下後頻看若有蟲急打殺以桑火油煎使焦棄急水中三日不下更服須在月望前日服忌見喪衣婦人猫犬之類後服治勞補氣藥取差 沈內翰云威愍孫元規藏此方類能活人江人陰萬融病勞四體如焚垂危夜夢神人腸壅一月如大盤明爛不可正視逼人心骨背寒已而悸寢俄頃扣關乃威愍使人遺之藥服

之遂差問其名則明月丹也始悟向之所夢大體此藥最治熱勞又方云傷寒煩躁骨熱皆治療一方有
硼砂等分

勞瘵

附論

夫骨蒸殭瘵傷連尸瘵蟲瘵毒瘵熱瘵食瘵鬼瘵等皆曰傳尸以瘵者瘵也病自上瘵下與前人相似故曰瘵其變二十二種或三十六種或九十九種大略令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄濁髮乾而聳或腹中有塊或腦

後兩邊有小結核連腹類箇或聚或散沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或後下利羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死死後乃疰易傍人乃至滅門者是也更有蜚尸寒尸喪尸尸疰等謂之五尸乃大小附着等證不自知其所苦無處不思以三因攻之內非七情所忤外非四氣所襲蟲苦麗乎不內奈其證多端轉變遷移難以推測故自古及今愈此病者十不保

一所謂

關

病者憎寒發熱自汗面白目乾口苦精神不
守恐畏不能獨外其傳在肝 病者憎寒發熱面黑鼻
燥忽忽喜忘大便若難或復泄瀉口瘡其傳在心 病
者憎寒發熱面青唇黃舌本強不能嚥飲食無味四體
羸瘦吐涎沫其傳在脾 病者增寒發熱面赤鼻白乾
燥毛折咳嗽喘急時吐白涎或有血線其傳在肺 病
者增寒發熱面黃耳輪焦枯脰骨疼痛小便白濁遺瀝

胸痛其傳在腎所謂勞蓋者二十四種隨證皆可考尋
毛折髮焦肌膚甲錯其蒸在皮 外人覺熱自反惡寒
身振癰 其蒸在外髮焦鼻衄或傷屈血其証在肉血
身熱煩燥痛如針刺其蒸在脉 爪甲焦枯眼昏兩脇
急痛其蒸在筋 版齒黑燥大牙酸疼其蒸在骨 背
脊疼痛胛骨酸癢其蒸在髓 頭眩熱悶口多濁涎眼
多眵淚其蒸在腦 男子失精女子白淫其蒸在房
乍寒乍熱中脘興膈心中煩悶其蒸在三焦 小便赤

黃凝濁如膏其蒸在膀胱 傳道不均或秘或泄腹中
雷鳴其蒸在小腹 大腹隱痛口鼻乾疼其蒸在大腹
口鼻乾燥腹脹睡卧不安自汗時出其蒸在胃 耳
聾脇下痛其蒸在膽裏脹急後重肛門澀秘其蒸在回
腹 小腹疼痛筋脉縱緩陰器自強其蒸在宗筋 眼昏
淚下時復眩暈燥怒不常其蒸在肝 舌焦黑氣短煩
悶洒洒浙浙其蒸在心 唇乾口瘡胸腹脹悶畏寒不
食其蒸在脾 咳嗽喘滿咯痰吐血聲嘶音啞其蒸在

肺 耳輪焦枯脚氣酸疼起居不適其蒸在腎 情想
不能無故泄精白物綿綿而下其蒸在右腎 心主胞
絡心膈噎塞攻擊疼痛俛仰煩冤其蒸在膈諸證雖
不同其根多有蟲齧其心肺治之不可不絕其根也內
經曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出
清液先唾血四肢清目腫時時前後血病名血枯此得
有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來
也夫肝藏血受天乙之氣以為滋榮者也其經上胃膈

布脇肋令脫血失精肝氣已傷故血枯涸而不榮胸脇支滿以經絡所貫然也妨於食則以肝病傳於脾胃病至則先聞腥臊臭出清液以肝病肺乘之先唾血四肢清目眩時時前後血皆肝病血傷之證也

方

河車丸

出大全良方

治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸等疾

河車

一枚初生男子者尤良長流水中蕩洗紫血淨入鍋熟煮用手擘成數小片焙乾須在一

日內便碾成末纔經宿即不乾碾不成末矣本草方於內治療病瘵病胞衣飄生者尤佳血氣羸

瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病漸漸瘦瘁者以
五味和之如饑餧法與服之勿令病者知亦治天
行熱病之效胞衣埋地中七八年化成水澄清如
真水南方之人以甘草升麻和諸藥羅盛埋之三
五年發之
此為藥服

雪白茯苓

兩半

乾山藥

兩一

揀參

兩一

右為細末麪糊為丸如梧桐子大以少麝香末為衣
每服三五十九丸米飲溫酒鹽湯送下空心服嗽甚者
五味子湯下

菴蓉丸 治婦人胸脇支滿聞腥臊氣唾血目眩不能
飲食泄瀉不已日久血枯

茯苓

酒浸

熟地黄

白茯苓

兔絲子

製

附子

炮

當歸

炒

白石英

研

五味子

各一兩

禹餘糧

製研一兩

人參

半兩

烏賊魚骨

去甲一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大酒下二三十丸米湯

亦可空心日中臨卧各一服

掌中金丸

出投粹方

治婦人乾血氣

川山甲

炮

甘草

苦丁香

川椒

苦葶藶

白附子

草烏頭

猪牙皂角

各二錢

巴豆

一錢全用研

右通為細末生葱絞汁和丸如彈子大每用一九新
綿帛定內陰中日即白二日即赤三日紅

肉蓯蓉丸 治婦人胸脇支滿聞腥臊氣唾血目眩不
進飲食泄血不已日久使血枯燥

肉蓯蓉

酒浸切焙

熟地黃

焙

白茯苓

去皮各一兩

人參

半兩

兔絲子

酒浸別為末一兩半

白石英

五味子

烏賊魚骨

去甲各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九至三十

丸溫酒或米飲下藥汁化阿魏再煮十數沸去滓候
溫作二次調下件藥末

朱砂

半兩

小檳榔

半兩

麝香

半兩

右三味研令極細分為二服用湯使調下五更初一
服三點再一服昆時間取下蟲遂絕根本若見蟲色
白者此病必瘥若黑色則已傳入腎經不可救也服
藥後只以淡粥補支并不動原氣效驗無比切須秘
之世傳勞蟲有靈輕易傳之則傷醫者此說殆醫者

秘惜其方不可以援人耳要須密重之則無洩慢天
機乃起死還生功同造化鬼神護助自有靈效大凡
傳尸勞者必須先服此一藥後十五方隨證治不可
以槩用藥調治三五箇月再服此取蟲藥則永除根
本如取下蟲色已黑縱服後藥亦無補也然則能使
不傳他也

養正膏

出大全良方

治傳尸出汗取蟲辟邪

鼈甲

一兩醋炙

青蒿

一握

淡頭

三七粒

葱白

二莖

安息香

二分研

桃柳桑

各七莖

桃仁

四十九箇去皮尖雙仁去

天靈蓋

用七頭大片醋炙

右十味隔夜以水一升浸至五更煎至半升再以童便半升同煎取四合又用檳榔一箇為末麝香一錢七將所煎藥去滓調下至日高二丈時放溫頓服以出汗審看十指汗出如藕絲五色臭穢汗出後仍瀉下蟲狀惡物盡甚者旬再服

大靈明月丹 治傳尸

雄黃 木香

各半兩

輕粉

一分

天靈蓋

炙一兩

鼈甲

醋炙一兩

兔屎

二兩

右為末用法酒一大升大黃半兩為末熬膏入前藥
為丸如彈子大朱砂為衣傳尸勞肌瘦面黃嘔吐咳
嗽不定先燒安息香令煙出空心日午夜卧各一
乾地黃湯 治婦人先有所脫血或醉中房勞傷肝致
使月事不來血枯燥

熟地黃

澤蘭葉

白茯苓

去黑皮

人參

五味子

附子

炮製去皮臍

當歸

切焙

禹餘糧

火煨醋淬各一兩

右粗搗即每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空心日午夜卧日三一方用薑五片

磁石丸 治婦人陰氣衰弱血枯不榮月事不來

磁石

火煨醋淬三七遍

白茯苓

去黑皮

附子

炮製去皮臍各一兩

人參

當歸

切炒

乾地黄

焙各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九至三十丸溫酒或米飲下空心日午夜卧日三服

破經丸

出仁存方

治婦人乾血氣久滯腿臍腹冷痛寒熱往

來血塊血刺瘰癧癰疽四肢無力飲食漸減久變成
虛勞痰嗽

川大黃

一兩

硃砂

研

川芎

各半兩

紅娘子

四十箇

馬鳴退灰

三錢

當歸

六錢切焙

右煎小醋一盞入大黃末作膏和後五味如米豆大
每服十丸至十五丸煎紅黃酒下食前三兩時間覺
臍腹下微痛藥行大小便取惡血濃粘為效如未覺
加至二十九三五服效要內消只服三五丸每日常

服觀患老少輕重以意加減

烏賊魚骨丸

出大全良方

治婦人血枯胸脇支滿妨於飲食

病至即聞腥臊之氣先唾血出清液或前後泄血四肢清目眩轉月事衰少不來

烏賊魚骨

去甲四兩

藺茹如一兩

右為末用雀卵不拘數和成劑令得所丸如小豆大每服五丸加至十九以鮑魚湯下後以飲食壓之食後日三服

行經丹

出仁存方

治婦人乾血氣滯腰脚臍下痛寒熱血脉

阻滯

斑猫

二十箇
去頭翅

杏仁

二十箇
去皮炒

右同研白麴糊為丸如小豆大每服十丸煎桃仁湯
下日未出小便內取下血片覺臍下痛

治婦人乾血氣

赤電見

七箇燒存性
陰乾亦可

當歸

一兩
炒乾

右為末每服三二錢空心溫酒調下

血極膏

出濟生拔方

治婦人乾血氣

川大黃

醱醋

右二味熬成膏就如雞子大每服一丸熱酒化開卧溫服大便利一二行後紅脉自下是婦人僊藥也加歸頭更妙

治婦人血枯

出神效方

右用川大黃為末醋熬成膏就如雞子大作餅晃酒磨化一餅

治婦人血氣不行上氣衝心變作乾血氣

用絲瓜兒一箇燒存性每服一箇用弦絲燒灰為飲

子空心溫酒調下

神仙秘

出大全良方

取傳屍勞蟲服此藥須先擇良日焚香

禱祝令病人設榻面向福德方服即有神效不可使病人知其藥味

青桑皮

楊柳枝

梅枝

桃枝

口南枝取東引者各七莖

葱白

七莖

阿魏

二分

青蒿

一握

如無

以子代

真安息香

一分

研

已上八味除阿魏外用童子小便一升半煮取藥耗
及一半去滓將吸之不嗽非傳尸也不可用此藥若
煙入口不能禁止乃傳屍宜用此藥五更初服勿令
病人知以童便共酒一盞化一九服如暇人行十里
乃必吐出蟲如燈草細長及寸或如爛瓜李又如蝦蟇
狀各不同未效次日再服以應為度

熱勞

附論

夫婦人熱勞者由心肺壅熱傷於氣血不調臟腑壅滯

熱毒積蓄在內不得宣通之所致也其後心神煩燥頰赤頭疼唇澀乾四肢狀煩熱煩渴不止口舌生瘡神昏沉少起多卧飲食無味舉體疲熱煩疼或時心怔或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒夫婦人勞傷氣血虛弱又陰陽交爭虛實不調故令寒熱如瘧也

方

胡黃連丸 治婦人熱勞煩悶四肢黃瘦疼痛時有咳嗽

不欲飲食

胡黃連

兩半

柴胡

去苗一兩

赤芍藥

三分

鼈甲

二兩塗醋炙

知母

兩半

犀角屑

三分

川升麻

兩半

玄參

兩半

人參

蘆頭半兩去

地骨皮

三分

當歸

兩半

茯神

三分

杏仁

三分湯剉浸去皮

麥門冬

一兩半

紫苑

三分洗

川大黃

三分剉

甘草

兩半微赤

燉秦朮

三分

枳殼

三分麩炒

桔梗

半兩去蘆頭

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大不計時

候以粥飲下三十丸

益母草煎丸 治婦人熱勞煩悶四肢疼痛經脉滯澀

腹脇煩悶不欲飲食

益母草汁一升 青蒿汁一升 生薑汁三合 童子小便一升

已上四味於銀器中以漫火熬成膏

柴胡一兩 去蘆 人參三分 去蘆頭 麥門冬一兩 去心焙 琥珀三分 細頭

桃仁一兩 湯浸去皮尖 雙仁麤炒微黃 地骨皮三分 枳殼三分 麤炒微黃 去穰

白朮三分 桔梗三分 去蘆頭 鼈甲二兩 塗醋炙 令黃去裙欄 赤芍藥一兩

當歸三分 生乾地黄一兩 鬼箭羽一兩 麝香一分 細研

右為末用上熬成膏和搗三二百杵丸如梧桐子大食前以溫水下三十丸

青蒿丸

出聖惠方

治婦人熱勞咳嗽肌體消瘦心膈煩熱後多

盜汗四肢痠痛食少無力

青蒿

一兩半

天門冬

一兩去心焙

柴胡

一兩去苗

紫苑

一兩去苗土洗

地骨皮

一兩

旋覆花

一兩

貝母

一兩

人參

一兩去蘆頭

龍膽

半兩

杏仁

一兩半

湯浸

去皮

秦艽

一兩

川大黃

一兩

碎微炒

剉

天靈蓋

一兩半

醋炙令黃

葳蕤

一兩

鼈甲

一兩半

醋炙

令黃去裙襴

黃耆

一兩判

枳殼

一兩麩炒微黃去穰

甘草

三分炙微赤判

麝香

半兩細研

朱砂

一兩細研水飛過

石為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧

桐子大每服不計時候以麥門冬湯下二十九

鼈甲丸 治熱勞尤佳

河車

依前法修製

鼈甲

醋炙半兩

桔梗

白芍藥

大黃

煨

甘草

苦參

貝母

知母

秋石

草龍膽

豉心

黃藥子

莪木

犀角

消石

各半兩

右為末以前膏子為丸湯飲如前

胡黃連散

出聖惠方

治婦人熱勞體瘦經脉不通四肢疼痛

口乾煩渴不得睡卧飲食減少

胡黃連

三分

天靈蓋

一兩塗醋炙令黃

柴胡

一兩去蘆頭

當歸

三分

鼈甲

一兩半塗醋炙令黃去裙襴

赤芍藥

二分

地骨皮

一兩

木香

半兩

生乾地黄

一兩

黃耆

一兩判

麝香

一分細研入

川大黃

一兩判碎微炒

青蒿

三分

黃芩

三分

犀角屑

一兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分桃柳

心各七莖煎至六分去滓不計時候溫服

半夏散

出聖惠方

治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼

痛或時寒熱痰逆嘔吐不思飲食

半夏 知母 苦梗 赤茯苓 人參 秦艽

赤芍藥 麥門冬 烏梅肉

各半兩

鼈甲

醋炙

北柴胡

黃耆

各一兩

大腹皮

三分

甘草

一分

右為粗末每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去

滓溫服無時候

犀角散

出聖惠方

治婦人熱勞心胸煩熱不思飲食四肢多

疼經脉滯澀

犀角散

半兩

柴胡

一兩去苗

赤芍藥

三分

虎杖

三分

紅藍花

一兩

黃芩

半兩

鼈甲

一兩

塗醋炙

甘草

半兩

地骨皮

三分

茯苓

三分

麥門冬

三分

茯苓

三分

麥門冬

三分

當歸

三分

枳殼

三分

微黃去穢

炒

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

紅藍花散

出聖惠方

紅藍花

一兩

柴胡

一兩半
去苗

當歸

生乾地黃

虎伏

赤芍藥

鬼箭羽

大腹皮

麥門冬

去心

土瓜根

地骨皮

枳殼

麩炒微黃去
穰各一兩

甘草

半兩炙
微赤剉

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

鼈甲地黃湯

治婦人熱勞手足煩心怔忡婦人血室

有乾血身體羸瘦

柴胡

當歸

麥門冬

鼈甲

醋炙

石斛

白朮

熟地黄

茯苓

去皮

秦艽

各一兩

人參

肉桂

甘草

各半兩

右咬咀每服四錢以水一盞半薑五片烏梅半箇同煎至七分去滓溫服不計時候此藥專治熱勞脾胃快者可服若脾虛汗多不可服

鼈甲散

出聖惠方

治婦人熱勞發渴壯熱四肢煩疼漸漸黃

瘦心胸蹙悶

鼈甲

一兩半塗醋炙令黃去裙襴

知母

三分

川大黃

三分剉碎微炒

黃芩

地骨皮

赤芍藥

各三

甘草

半兩炙
微赤剉

人參

三分去
蘆頭

麥門冬

一兩
去心

黃耆

剉三

柴胡

一兩半
去蘆頭

桑根白皮

三分
剉

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白

五寸豉五十粒煎至六分去滓不計時候溫服

黃耆散

出聖
惠方

治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不

欲飲食

人參

黃芩

當歸

各三

北柴胡

去皮一
兩半

地骨皮

黃耆

赤茯苓

麥門冬

生地黃

赤芍藥

各一
兩

甘草

一分

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎至六分去滓溫

服無時候

雞蘇丸

出拔粹方

治虛熱昏冒倦怠下虛上壅血衄血

雞蘇葉

半斤

黃耆

半兩

甘草

川芎

各一分

荊芥穗

一兩

防風

一兩

苦梗

半兩

甘菊花

一分

生乾地黄

真腦子

半錢

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸用麥門冬去

心煎湯嚙下又治肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不

得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前
子一分每服一丸煎桑枝湯嚼下日可六七服桑枝
剉炒香每用水三盞煎至一盞去滓下藥

知母散

出聖惠方

治婦人熱勞體瘦壯熱四肢煩疼咽喉不

利少思飲食

知母

黃芩

各三分

柴胡

去苗

生乾地黄

各一兩

赤芍藥

麥門冬

射干

川升麻

各三分

甘草

半兩炙微赤剉

右為粗散每服四錢水一中盞入生薑半分淡竹葉

二十七片同煎至六分去滓不計時候溫服

子苓散

出拔
粹方

白芍藥

子苓

人參

白茯苓

黃耆

一兩

麥門冬

生乾地黄

各半兩

苦梗

右為粗末先用竹葉一握小麥七十粒水三盞薑三

片煎至一盞半入藥末三錢重煎至七分去滓溫服

治一切婦人骨槽勞熱宮臟不調因感癆氣子母相傳

邪氣干心非時驚恐如人將捕戰慄不安

陽子建
護命方

桑寄生

半兩

人參

茯苓

鼈甲

醋炙

柴胡

去毛

獨活

天靈蓋

醋炙

川芎

各一分

沉香

二銖

木香

三銖

右杵為細末每服二錢水一盞煎至兩三沸急瀉

出空心食遠時和滓喫

猪肚丸

出聖惠方

治婦人熱勞羸瘦

北柴胡

赤茯苓

人參

黃耆

各一兩

黃連

三兩

地骨皮

木香

各半兩

桃仁

鼈甲

各一兩

右為細末用好嫩猪肚一枚淨洗將藥末入猪肚內

以綿縫合蒸令爛熟於砂盆內研膏丸如梧桐子大
食前粥飲下三十丸日午再服

逍遙散

出醫方集成

治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目

昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血
熱相傳月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又主室女血
弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓 白朮

白芍藥 當歸

去蘆酒浸
半日微炒

北柴胡

去苗各
一兩

甘草

炙一
兩半

右剉散每服三錢水一盞半薑三片麥門冬三十粒
去心煎服不拘時候一方加知母地骨皮一方薄荷
湯下無麥門冬一方名人參散治婦人血熱虛勞骨
蒸兼治邪熱客於經絡肺痰嗽五心躁煩頭目昏痛
夜多盜汗補真氣解勞倦用人參白朮茯苓柴胡半
夏當歸赤芍藥乾葛甘草黃芩各等分㕮咀每服四
錢水一盞半生薑五片棗二箇煎至六分不拘時候
服應有勞熱之証皆可服之熱退即止但婦人寒

熱亦有因經血滯閉者遂致五心煩熱及骨節間熱
或作虛勞治之反以為害積日既久乃成真病法當
行其經血若月事以時自然平治宜以局方大聖散
用紅花酒煎調服不能飲者醋湯代之乃以經丸子
醋湯嚥下此二藥大治經事不調或腹有血塊或久
無子息服之數月其效特異但非可數服責其無功
或因下血過多發為寒熱當用當歸地黃之類如大
建中湯藥令湯養榮湯十神飲雙和散輩是也然有

痰飲停積之人則難用此蓋當歸地黃與痰不得其
宜由是不進飲食遂成真病至於困頓者多矣 痰
飲中 致生寒熱者宜以二陳湯參蘇飲等藥療
之應手而效 更有服退熱冷藥太過因而咳嗽不
利發熱自汗皆可用惟真武湯增損名故陽湯仍佐
以震靈丹其詳更於真武湯方中求之如早灸膏肓
其效尤着但是病虛損發熱若虛勞寒熱及久患瘧
疾皆宜灸之輕者穴五七十壯養其火力重者三數寅夜

熱若永除次日再灸數十壯或有餘熱逐日灸三七壯養其火力以熱退為期今人見病人畏灸多謂無力勝火當候少愈此大不然倘能漸安又何必灼艾此皆悠悠之語成則悔無及矣凡灸比穴者切不可灸三脘腹中臍下等處若前後受火則灸氣攻中脘隔截往往嘔吐清水或氣息喘急或渴欲引飲名為水刑灸有致斃治法以黑豆煎湯徐徐解之輕者尚可療也或謂灸膏肓多致不救然乃灼艾傷脘已

不及耳

秦艽散

出大全良方

治血經有熱月脉凝滯五心煩倦

麥門冬

秦艽

各一兩

生地黄

當歸

各半兩

地骨皮

鬱金

蘇木

各半兩

右為細末每服一錢半水一盞紅花少許同煎至七分溫服若經脉調不用紅花忌酒熱物此方可服一年

冷勞

附論

夫冷勞者由血氣不足表裏俱虛臟腑久挾宿冷致令飲食不消腹內積聚臍下冷痛月候不調骨節痠痛手足無力肌膚羸瘦面色痿黃故曰冷勞也

方

木香丸

出聖惠方

治婦人冷勞經脉不調臟腑氣滯四肢疼

痛飲食無味漸加羸瘦

木香 琥珀

吳茱萸

炮

當歸

牡丹皮

三棱

赤芍藥

附子

炮

延胡索

川芎

各三分

北柴胡

乾薑 人參 桂心 白朮 厚朴 熟地黃

鼈甲

醋炙去裙襴

陳橘皮

各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心服

溫酒下

栢子仁丸

出聖惠方

治婦人冷勞腹脇疼痛不思飲食四肢

少力漸加羸瘦

栢子仁

三分

乾漆

三分炒令煙出

當歸

三分碎微炒

麝香

半兩細研

鼈甲

一兩半塗醋炙令黃去裙襴

紫石英

三分細研水飛過

熟乾地黃

白朮

肉蓯蓉

酒浸一宿剖去皺皮乾

乾薑

炮製剉

牛膝

去苗

桂心

赤芍藥

附子

炮製去皮臍

芫薺

木香

琥珀

桃仁

各三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為末入麝香令勻煉蜜和搗三百杵丸如梧桐

子大空心及晚食前以溫酒下三十丸

猪肝散

出聖惠方

治婦人冷勞脾胃虛乏大腸轉洩水穀不

化四肢羸瘦口内生瘡不思飲食漸加無力宜服此

藥

北柴胡 縮砂仁 蒔蘿 葷撥

各三分

蕪夷仁

白朮 白芷 胡椒 白薑 陳皮 茵陳

人參 木香 紫苑 白芍藥 北細辛

桂心

各半兩

右為細末以獼豬肝一具去脂膜切如柳葉片以新汲水洗過入葱白三寸細切入藥末半兩於鉢內以新水二大盞入鹽酌少許麤碗合着令水盡空心以意食之喫粥飲下食後良久飲煖酒一盞為妙晚食

前再服亦佳

煮肝散

出聖惠方

治婦人冷勞面色痿黃不多思食或時腹

痛四肢少力積漸羸瘦

白芍藥

川芎

苦梗

厚朴

桂心

各三分

白薑

當歸

荊芥穗

蒔蘿

胡椒

蕪夷仁

膏永

柴胡

紫苑

各半兩

陳皮

一兩半

右為細末每服半兩以獾猪肝一具用鹽醋葱白各少許相和如尋常煮熟空心任意食之然後喫溫酒

二盞尤佳

治經脉不調少思飲食

熟乾地黄

鼈甲

陳皮

各半兩

北五味子

當歸

川芎

桂心

各半兩

川牛膝

人參

白

附子

白芍藥

白茯苓

黃耆

各二分

甘草

一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下三十丸

厚朴散

治婦人冷勞氣面色痿黃四肢羸瘦多卧少

起不欲飲食身體虛困

厚朴

一兩去麁皮塗生
汁薑炙令香熟

木香

半兩
當歸三分剉
碎微炒

白朮

人參

去蘆頭
各三分

熟乾地黄

一兩半
半兩

半兩湯浸
七日去滑

牛膝

二分
去苗

白茯苓

三分

乾薑

半兩炮
製剉

白芍藥

半兩
附子

三分炮製
去皮臍

陳橘皮

三分湯浸
去白穰焙

甘草

半兩炙
微赤剉

右為麁散每服四錢以水一中盞入生薑半分去滓

不計時候溫服

牡丹丸

治婦人冷勞血海氣虛經絡不利四肢疼痛

不欲飲食漸加羸瘦

牡丹

分三

牛膝

去苗一兩

桂心

分三

附子

去皮臍一兩炮製

木香

分三

桃仁

雙一兩湯浸去皮尖
仁麩炒微黃

熟乾地黄

兩一

水蛭

令黃三分炒

乾漆

炒三分揭碎
令煙出

芳蘄

分三

菴藺子

分三

蜜蟲

足三分去翅
微炒

延胡索

兩半

當歸

碎微炒
分三

右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大空心

及晚睡前以溫酒下三十丸

牛膝丸 治婦人冷勞血氣凝滯面色痿黃四肢羸瘦

不思飲食腹中多痛

牛膝

一兩
去苗

川椒

一兩去目及閉
口者微炒出汗

青橘皮

三分湯浸
去白穢焙

芳藟

三分

木香

半兩

附子

一兩炮製
去皮臍

當歸

三分剉
碎微炒

白朮

乾薑

各三分炮
製剉碎

熟乾地黄

一兩

澤蘭

三分

肉豆蔻

一兩
去殼

蓬莪茂

一兩

硃砂

一兩半
研入

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大空心及

晚食以煖酒下三十丸

訶梨勒散

治婦人冷勞氣攻脾胃腹脇妨悶四肢不

和喫食減少漸至虛羸

訶梨勒皮

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熟

柴胡

各一兩去苗

木香

半兩

當歸

半兩

桂心

半兩

芎藭

三分

白芍藥

三分

白朮

三分

陳橘皮

二分湯浸去白穰

熟乾地黄

三分

人參

三分

去蘆頭

牛膝

一兩去苗

甘草

一分炙微赤剉

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

桃仁散

治婦人冷勞氣滯經脉不通腹脇妨悶四肢

羸瘦不思飲食一方有鼈甲

木香 呵子皮 白薑 桃仁 人參 各半 陳皮

琥珀 桂心 各一兩 赤芍藥 延胡索 赤茯苓

川牛膝 當歸 白朮 各三分

右咬咀每服四錢水一盞生薑三片煎至七分去滓
空心溫服

厚朴湯 治婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱白汁小便
俱出用厚朴如手大長四寸以酒五升煮兩沸去滓
取桂一尺為末內汁中調和一宿勿食旦頓服一方

無桂用水濃煎空心溫服治月水不通

硃砂煎丸

治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢羸

瘦不食

鼈甲

醋炙

桃仁

去皮尖
麩炒

木香

五靈脂

去沙
石炒

當歸

硃砂

二兩醋一
升熬成膏

右為細末用硃砂膏為丸如梧桐子大空心服溫酒

下二十九

骨蒸

附論

夫骨蒸勞者由熱毒氣附骨故謂之骨蒸也亦曰傳尸
亦謂殮殮亦稱復連亦名無辜丈夫以疰癖為根女人
以血氣為本無問少長多染此病內既傷於臟腑外則
損於肌膚日久不痊遂致羸瘦因服冷藥過度則傷於
脾氣既衰而傳五臟脾初受病或脹或妨遂加洩痢肌
肉瘦瘠轉增痿黃四肢無力飲食少味既脾受已次傳
於腎腎既受病時時盜汗腰膝冷疼夢鬼交侵小便赤
黃腎既受已次傳於心心既受病往往怯悸或喜或噤

兩頰常赤唇色如朱作熱乍寒神氣不守心既受已次傳於肺肺既受病胸膈短氣咳嗽多唾皮膚甲錯狀如麩片肺既受已次傳於肝肝既受病兩目昏暗脇下妨痛不欲見人常懷忿怒五臟既病漸漸羸瘦即難療也

方

人參散 治婦人骨蒸勞身體壯熱手臂疼痛月水不通日漸瘦瘁兩脇氣刺四肢羸弱腹內塊生時有咳嗽不欲飲食

人參

二兩去蘆頭

地骨皮

二兩鼈甲

三兩塗醋炙令黃去裙襴

黃芩

三分

羚羊角屑

二兩

赤茯苓

二兩知母

一兩半

柴胡

三兩去苗

當歸

川朴硝

各三分

枳殼

二兩麩炒微黃去穰

牛膝

二兩去苗

赤芍藥

一兩

生母

三兩煨令微黃

菰蘆根

一兩桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

草豆蔻

一兩去皮

安息香

半兩甘草

三分炙微赤剉

柴紫

一兩半去心

天靈蓋

一兩半塗醋炙令黃

右為粗末每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三

枚煎至六分去滓食前溫服

黃耆丸

出聖惠方

治婦人骨蒸煩熱四肢羸瘦疼痛口乾心

燥不得卧眠

黃耆

麥門冬

去心

茯神

北柴胡

甘草

各一兩

生乾地黄

一兩

酸棗仁

郁李仁

杏仁

去皮尖雙

仁麩炒黃

枸杞子

人參

去蘆

黃芩

各三分

百合

枳殼

去麩

炒

赤芍藥

知母

各半兩

鼈甲

二兩製

秦朮

半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大清粥吞下三十丸

無時候

天靈蓋散

出聖惠方

治婦人骨蒸勞四肢無力每至晚間即

熱兩頰紅色飲食不下心神煩燥

天靈蓋

醋炙

安息香

地骨皮

當歸

山梔子仁

人參

去蘆

貝母

去心

黃連

桃仁

去皮尖雙仁麩炒黃

檳榔

各一兩

鼈甲

醋炙

北柴胡

生乾地黄

赤茯苓 麥門冬

各一兩半

右為粗末以童子小便一大盞桃柳枝各七寸薑五

片葱白五寸藥四錢煎至七分去滓溫服

青蒿鼈甲煎丸

出聖類鈴方

治骨蒸勞退熱鮮肌進食

九肋鼈甲一個 北柴胡二兩 甘草 杏仁 地骨皮

桔梗 當歸 人參 赤芍藥各一兩 胡黃連

宣連各一分 官桂 木香各半兩 麝香一兩 酥 蜜各三兩

右為細末用青蒿一斤童子小便五升好酒一升熬
青蒿汁約二升已來攪去青蒿不用入酥蜜再熬成
膏冷後入藥末搜和為丸如梧桐子大每服十五丸
溫酒下米飲亦得日進三服如秋後合再入桃柳枝
七莖此藥甚妙

赤茯苓散

出聖惠方

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四

肢無力煩疼痰壅弟唾稠粘不思飲食

赤茯苓

一兩 鼈甲

二兩塗醋炙令黃去裙襴

柴胡

去苗

麥門冬

去心各一兩

人參

去蘆頭

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

木香

白朮

各三分

桂心

半兩

川大黃

一兩剉碎微炒

瞿麥

赤芍藥

當歸

半夏

湯洗七遍去滑各三分

甘草

半兩炙微赤剉

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

益母草九

出聖惠方

治婦人骨蒸勞瘦月候不通心神煩熱

四肢疼痛不能飲食

益母草

青蒿

各二斤

桃枝

一握長一寸

柳枝

一握長一寸

已上四味細剉用童子小便一斗於銀鍋中煎至三

升絞出滓煎成膏

柴胡

三兩去苗

朱砂

一兩細研水飛過

天靈蓋

一兩塗醋炙令微黃

木香

甘草

各一兩炙微赤剉

鼈甲

三兩塗醋炙令黃去裙襴

赤芍藥

二兩

犀角屑

二兩

麝香

半兩細研

桃仁

五兩湯浸去皮尖雙仁生研如膏

右為末用益母草膏都和搗五七百杵丸如梧桐子
大每服不計時候用烏梅甘草煎下三十九

獺肝丸

出聖
惠方

治婦人骨蒸勞熱體瘦煩疼不欲飲食

獺肝

一具鼈甲

醋炙

北柴胡

各兩半

川升麻

天靈蓋

醋炙

桃仁

去皮尖雙
仁麩炒黃

犀牛角屑

梔子仁

地骨皮

知母

各一兩

黃耆

三分

甘草

半兩

麝香

一分研

朱砂

一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大溫水下三十九無時

候

黃連散

出聖惠方

治婦人骨蒸勞熱四體昏沉背膊疼痛面

色痿黃漸漸無力

黃連

二兩去鬚

知母

一兩

鼈甲

二兩

塗醋炙令黃去裙襴

麥門冬

三分

去心

龍膽

半兩去蘆頭

甘草

半兩

炙微赤剉

柴胡

一兩半

地骨皮

白朮

黃芩

犀角屑

各三分

木通

一兩半

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分淡竹

葉二十七片煎至六分去滓不計時候溫服

青蒿散

出聖惠方

治婦人骨蒸勞熱四肢煩疼痛日漸羸瘦

青蒿

二兩

龍膽

一分

梔子仁

三分

知母

三分

黃連

一兩

去毛

鼈甲

二兩

塗醋炙

令黃去裙襴

黃耆

一兩

地骨皮

半兩

白朮

一兩

桑根白皮

一兩

甘草

半兩

柴胡

一兩

去苗

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

柴胡散

出聖惠方

治婦人骨蒸勞熱咳嗽胸膈痰壅腹脇妨

悶不欲飲食

柴胡

一兩

半夏

半兩

湯洗

七遍去滑

川大黃

三分

剉

微炒

百合

三分

分

枳殼

三分麩炒
微黃去穰

桑根白皮

一兩
剉

赤茯苓

一兩
知母
三分

麥門冬

一兩
去心

秦艽

三分
去苗

紫苑

三分洗
去土

甘草

半兩炙
微赤剉

黃芩

三分

赤芍藥

三分

木通

三分
剉

鼈甲

二兩塗醋炙
令黃去裙襴

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

麥煎散

出聖
惠方

治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心

胸煩壅

赤茯苓

當歸

乾漆

炒令
煙盡

鼈甲

醋炙

常山

白朮

大黃

煨

北柴胡

生乾地黄

石膏

各一兩

甘草

右為細末每服二錢水一盞小麥五十粒煎至分

食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩蘇東坡

云比川吳通判官方療骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗極

效麥煎散甚多此方吳尹寶之如稀世之珍其效可

知

金花散

治室女骨蒸熱勞

霍香 零陵香 延胡索 芍藥 白芷 川芎

當歸

桂心

各一分

蓮子心

晚蚕蛾

各二分

右為細末溫酒調下二錢日二服

鼈甲丸

出聖惠方

治婦人骨蒸勞月水不通脇下疼癖往往

腹痛

鼈甲

二兩塗醋炙令黃去裙襴

土瓜根

桂心

荆三稜

牡丹

牛膝

去黃

川大黃

剉碎微炒

訶梨勒皮

各一兩

桃仁

二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

琥珀

一兩細研

右為末煉蜜和擣三百杵丸如梧桐子大不計時

候以桃仁湯下三十丸

猪肚丸

出永類
鈴方

治骨蒸勞唇頰赤氣粗口乾遍身壯熱或

多虛汗大腸澀秘小便赤黃飲食全少

青蒿

鼈甲

醋炙

北柴胡

木香

生乾地黄

各一兩

青皮

半兩

宣黃連

二兩

右為末以猪肚一箇洗淨內入藥在內繫定蒸令極軟研如泥為丸如菉豆大湯下十五丸空心日三服忌溫酒麪毒物

石膏散

出永類
鈴方

治骨蒸寒熱外寒內熱附骨蒸盛之時

四肢微瘦足跌腫者病在臟腹中用真石膏不以多
少研令極細汲新水和服方寸匕取身無熱為度

鼈甲丸

治男子婦人童男室女五勞七傷傳症飛尸

注八極骨蒸肺痿黃瘦虛勞無肉肌肉不生婦人血
蒸五心煩熱血蒸勞氣室女月閉黃瘦氣塊腸痛經
脉不調乾嗽咽膈不利癥瘕積塊臉赤口瘡已上等
疾

黃耆 柴胡 枳殼 知母 白茯苓 沉香

人參 附子 木香 升麻 肉桂 胡黃連

杏仁 當歸 常山 羌活 荆三稜 烏梅肉

安息香

明者同胡
桃肉細研

右共十九味脩製了各稱一兩為末用活鼈一箇重
十兩或半斤者河水養七日須逐日換新水用童子
小便五升無灰酒五升於銀石器內漫火熬百沸先
更加桃柳枝東南上者各剉三條烏梅五十箇拍破

此三味用綿裹同鼈煎煮至半去桃柳三味鼈爛取出將肉研入膏骨并殼焙乾為末再入汁中熬如漆色或更入酒少許此在臨時斟酌盛放磁器中搜和藥入臼中杵千下丸如梧桐子大丈夫婦人十五歲已上二十至三十九溫酒下婦人荊芥酒下所煮膏子須斟酌多少勿令剩下却但少些子不妨却別熬酒若膏剝恐鼈不全故也凡服此藥恐熱三五更須服八仙飲子一服解之

八仙飲子

常山 白朮 秦艽 洪州鬼臼 甘草 紫蘇

赤芍藥 銀州柴胡

又等分洗淨為粗末每服半兩水 碗烏梅肉二箇

葱白薤白桃槐枝各七寸同煎至一盞去滓溫服滓

併煎

殺鬼丸

出聖惠方

治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連

麝香

三分

犀角屑

木香

白朮

各一兩

虎頸骨

醋炙

鬼箭羽

天靈蓋

醋炙

桃仁

去皮尖雙仁麩炒黃

雄黃

各半兩

辰砂

半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大溫水下二十丸藥亦辟瘟疫亦可帶之

牡丹湯

治婦人骨蒸經脉不通漸增瘦弱

牡丹皮

一兩半

桂

去粗皮

木通

剉炒各一兩

土瓜根

一兩半

芍藥

一兩半

鼈甲

醋炙去裙襴二兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒

右粗搗節每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

空心食後

天門冬丸

出大全良方

治伏連傳注腹中有堅硬積氣壅心

胸作痺痛引脇皆痛腕膈妨悶

鬼臼

天門冬

去心各三分

巴豆

芥子

不蛀皂角

醋炙各半兩

葉子雄黃

一兩

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服一九漸加至三十九空心湯水吞下臨卧一服常宜斟酌勿令泄瀉忌鯉魚山猪蘆笋

飛尸血厥

附論

夫飛尸者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻作血脉每發不可近見尸喪聞哀便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏沉得風雪便作沉尸者纏骨結臟衝心脇每發絞切遇寒冷便作注尸者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至變輒成大惡宜服忍冬葉方人平居無疾苦忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口噤不能言或微知人

惡聞人聲但如眩冒移時方寤此由汗多血少氣併於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒一名血厥婦人多有之宜服白薇湯倉公散

方

雄朱散

出大全良方

治因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣而成變

動不已似冷似熱風氣觸則發

雄黃

研

朱砂

研

苦梗

羌活

當歸

川烏

炮

升麻 龍齒 別研 犀角屑 白朮 芍藥 木香

鬼箭羽 白殭蚕 虎頸骨 醋炙 紫蘇子 炒 川芎

南星 炮 山梔子 陳皮 芥草 枳殼 去穰炒

黃芩 各一分 麻黃 半兩去根節 蜈蚣 二條去頭足 檳榔 二個

全蝎 一分炒

右為末每服二錢溫酒調下一日三服

白薇湯 出大全良方 治婦人鬱冒血厥忽如死不動不知人

目閉口噤移時微寤由汗多血少氣併於血陽獨上

而不下氣壅塞而不行氣過血還陰陽復通故移時
方寤婦人多有此病

白薇

當歸

各一兩

人參

半兩

甘草

一分

右㕮咀每服五錢水二盞溫服

倉公散

出大全良方

治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血便

死不知人及卧夢魘啗脚趾不覺者并諸毒氣等疾

瓜蒂

藜蘆末

雄黃

研

礞石

右為末研停用少許吹入鼻中得嚏氣通便活未嚏

再吹以得嚏為度此藥能起死人恐皂角者為正
樟鎮寶金寺僧傳腕王善醫術一日偶皆往鋪中市
藥藥鋪主人請僧就視一病僧因拉手同到病者榻
前扶一病婦年約五十閉目昏默醫者五六輩環視
問之皆以生飲順元散對僧診脉後一揖而出病家
邀之不來主人曰以倉公散吹入鼻中嚏而醒後與
藥問之則曰諸醫得將不察耳此病乃鬱冒血厥許
學士本事方白薇湯其證也若風藥則謬矣服至二

十九乃安

治傳尸血厥

出大全
良方

右以忍冬葉剉數斛煮令濃取汁煎之如雞子大日

三服

鼻衄
附論

夫婦人鼻衄者由傷動血氣所致也凡血氣調和則循環表裏經絡澀則不散若傷損動因而生熱氣逆流溢入於鼻者則成鼻衄也只有產後見衄者不可治評曰

凡鼻衄雖多因熱而得此疾亦有因怒氣而得之者曾
趙恭人鼻衄不止諸治不差召予治之先用蘇合香丸
四粒次用五苓散濃煎白茅花湯調服即止亦用芎歸
湯調理又有一富室男子鼻衄不止脉法數究竟云服
丹藥太過遂用黃連黃芩大黃為末水煎服愈調服亦
可

方

鮮肌湯

出氏方

治勞傷體熱鼻血能退熱

柴胡 麻黃 木通 茯苓 犀角 赤芍藥

蒲黃 黃芩 葛粉 生地黄 甘草

各等分

右判散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎

不計時候溫服

阿膠散

出聖惠方

治婦人鼻衄出血數升不知人事

阿膠

一兩半炒黃燥

桂心

半兩

細辛

半兩

龍骨

半兩

當歸

半兩

剉微炒

蒲黃

一兩

亂髮灰

一兩

右為散每服二錢溫酒調下不計時候

治婦人鼻衄出血數升不知人事

出聖
惠方

用搗楮葉汁飲一中盞效

又方

出聖
惠方

用艾灰吹鼻中

又方

出聖
惠方

用研紫檀木令細吹鼻中

又方

出聖
惠方

用梁上塵塞鼻中

刺蘇散

出聖惠方

治婦人鼻衄血不止

刺蘇

二兩

桑耳

二兩

亂髮灰

艾葉

各一兩炒

生地黄

二兩

蒲黃

一兩半

右為細末每服二錢無時粥飲調下一方為散每服

三錢水一中盞入淡竹茹一分煎至六分去滓不計

時候溫服

黃連散

出聖惠方

治婦人鼻衄不止心神煩燥

黃連

一兩去髮

犀角屑

一兩

刺蘇

二兩

雞蘇葉

二兩

生地黄

一兩

右為末散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓溫服不計時候

生乾地黄散

出聖惠方

治鼻衄血出數升不知人事

生乾地黄

二兩

黃芩

一兩

阿膠

二兩擣碎炒黃燥

栢葉

一兩

甘草

一兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓溫服不

計時候

藕汁飲

出聖惠方

治婦人鼻衄出血數升不知人事

生藕汁

三合

生地黄汁

三合

刺蘇汁

三合

牛旁汁

三合

白蜜

三合

右相和令勻每服一合不計時候

犀角地黄湯

出大
良方

治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便

黑心胸徹背痛

芍藥

三分

生地黄

半斤

牡丹皮

去心
一兩

犀角屑

一兩如無升
麻川者代

右㕮咀每服五錢水煎服有熱如狂者加黃芩二兩

蒲黃散

出聖
惠方

治婦人鼻衄出血數升不知人事

鹿角膠

三兩 搗炒黃燥

艾葉

一兩 微炒

續斷

一兩 蒲黃 一兩

右為細散每服二錢煮竹茹粥飲調下不計時候

麝香散

出聖惠方

治婦人鼻衄出血數升不知人事

人中白

一分

石榴花

一錢

故錦灰

一錢

麝香

半兩

右細研為散每取少許吹鼻中

伏龍肝散

出聖惠方

治婦人鼻衄出血數升不知人事

生地黄汁

六合

刺蘇汁

六合

生麥門冬汁

六合

伏龍肝末

右煖三味汁調下伏龍肝末一錢

生地黄飲

出聖惠方

治婦人鼻衄出血數升不知人事

生地黄

一兩

生薑

二兩

阿膠

一兩

搏碎炒黃燥別研為末

右先研地黄生薑取入阿膠末於銀器內煖過每服

一合

麥門冬飲子

出濟生拔粹

治衄血不止

麥門冬

生地黄

右剉每服一兩水煎衄血先硃砂蛤粉次木香黃連

大便結下之大黃芒硝甘草生地黄瘡軟子黃芩黃

連可選而用之

又方 治婦人鼻衄出血數升不知人事

錦灰分一人中白錢一

右相和研令勻分為二服以溫水調下立效

又方

石膏 牡蠣

右等分搗羅為末更研以新汲水調如煎餅面滴於

鼻中立止

又方

蓮子心

末

刺蘇汁

右研令勻每用酒鼻中

治產後鼻黑色及鼻衄脉當在血海起攻於鼻口血交
左右於其產後氣消血敗榮衛不理散亂入於經內
不還故令口鼻黑起及變鼻衄緣此產後虛熱變生
大病日久不可治名曰胃絕肺敗遇有此病疾用緋
線一條掛在產婦項髮兩條縛在婦人兩手中指節

間其血衄即止

又方 治婦人鼻衄出血數升不知人事

用白米粉以新汲水調下一錢

又方

用燒蝟皮灰細研入大豆少許綿裹內鼻中塞之

又方

用飲白馬尿一合即止

又方

用飲赤馬通汁一合并症入鼻中立止

又方

用青箱草汁灌入鼻中

又方

用人中白細研吹鼻

又方

用石榴花栢葉等分細研吹鼻中

又方

用搗芋根汁一合飲之立止

桑白皮散 治心胸積氣作胸痺引兩脇痛昏悶不收

音聲不清虛熱上壅作鼻衄

桑白皮分三枳殼 木通 生乾地黄 白芍藥

子苓 甘草

右為粗末每服三錢重水盪半煎至七分去滓溫服
食後

普濟方卷三百十九